

## توصیه مهم پرستاری در مورد نکات پس از تزریق رمدیسویر

### عوارض جانبی:

در درمان کووید ۱۹ عوارض جانبی جدی و ناخواسته که تاکنون گزارش نشده است.

### سایر عوارض (درصد نامشخص)

- متابولیک: افزایش قند خون
- کبدی: افزایش سطح سرمی فاکتورهای کبدی
- کلیوی: نارسایی حاد کلیوی، کاهش GFR افزایش کراتینین سرم، کاهش کلیرانس کراتینین (احتمال عوارض کلیوی وجود دارد).
- متفرقه: واکنش ناشی از انفوزیون (مانند افت فشار خون، تهوع، استفراغ، افزایش تعریق و لرزش)

LIBRARY..  
IMAM



## تداخلات دارویی رمدسیویر

### مشخصات کلی تداخلات

پیش داروهایی که از طریق فسفریلاسیون داخل سلولی فعال می شوند

**تداخلات رده X (پرهیز):**

کلروکین، هیدروکسی کلروکین

**کاهش اثرات داروها توسط رمدسیویر:**

تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

**کاهش اثرات رمدسیویر توسط داروها:**

کلروکین، هیدروکسی کلروکین

**افزایش اثرات داروها توسط رمدسیویر:**

تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

**افزایش اثرات رمدسیویر توسط داروها:**

تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

## موارد منع مصرف رمدسیویر

- سابقه حساسیت به دارو یا بروز واکنش های حساسیتی حین تزریق (تعریق، تهوع، لرز، استفراغ و..)
- سطح آلانین آمینوترانسفراز - ۵ برابر حد طبیعی در ابتدای درمان با افزایش سطح آلانین آمینوترانسفراز همراه با علایم التهاب کبدی با افزایش بیلی روبین کنژوگه، آکالین فسفاتاز یا INR
- eGFR کمتر از ۳۰ میلی لیتر / دقیقه
- محلول تزریقی رمدسیویر در کودکان (در کودکان بالای ۴۰ کیلوگرم، پودر لیوفیلیزه رمدسیویر قابل تجویز است).

### احتیاط:

سطح کراتینین بیش از ۱ (در نوزادان غیرنارس و ۷-۲۸ روزه)



Remdesivir

LIBRARY..  
IMAM

## توصیه های دارویی رمدسیویر

عملکرد کبدی (سطح آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین)، عملکرد کلیوی (سطح کراتینین سرم و کلیرانس کراتینین)، ترکیبات شیمیایی خون و هماتولوژی بیمار در ابتدای درمان و سپس به صورت روزانه در طول دوره درمان پایش شود.

### تهیه:

فربیا بریهی - سمیه عطایی آرا ( واحد ارتقاء سلامت کارکنان به بیماران )

Remdesivir